



CLINICA SAN MARTINO

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER L'ESECUZIONE DI PELVIGRAFIA / DEFECOGRAFIA / COLPOCISTODEFECOGRAFIA

*(In accordo al nuovo Codice di Deontologia Medica del Dicembre 2006, Capo IV Art. 33
-34-35-36-37-38, alla convenzione sui diritti dell'uomo e la Biomedicina del Consiglio d'Europa del
4/04/1997, Capitolo II, Art. 5-6-8-15,)*

- Effettuare un clistere di pulizia prima di partire da casa (Clismalax o Clismafeet da 125-250 ml);
- Presentarsi in accettazione 2h e 30min in anticipo rispetto all'orario dell'appuntamento;
- Il BARIO sarà somministrato circa 1,5 – 2 h prima dell'esame (cisto-colpo-defecografia);
- Dopo l'assunzione del BARIO il paziente sarà libero di muoversi in attesa dell'esame;
- L'esame è eseguibile anche durante il ciclo mestruale;
- Il paziente potrà mangiare sia la sera prima che il giorno stesso, prima e dopo l'assunzione del BARIO.

Particolari indicazioni:

I pazienti che devono eseguire anche altri esami (ad esempio manometria anorettale o ecografia trans-ale a sonda rotante) nella stessa seduta dovranno eseguire il clistere di pulizia nelle 2 ore antecedenti all'appuntamento. Il bario verrà somministrato prima dei suddetti esami. Gli esami saranno eseguiti nel periodo fra l'assunzione del bario e la defecografia / cisto-colpo-defecografia con opacizzazione ileare. Al termine della procedura il paziente potrà nuovamente riprendere tutte le attività e alimentarsi a piacimento. È possibile la sensazione di pesantezza addominale dopo l'assunzione del BARIO. Il BARIO non provoca scariche diarroiche.

Al termine della procedura il paziente potrà nuovamente riprendere tutte le attività e alimentarsi a piacimento. È possibile la sensazione di pesantezza addominale dopo l'assunzione del BARIO. Il BARIO non provoca scariche diarroiche.

A cosa serve la colpocistodefecografia?

La colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare è utile per l'individuazione di prolassi retto-anali, eventualmente associati a quelli uterini e vescicali, e per lo studio di malattie funzionali, quali la stipsi, la defecazione ostruita e l'incontinenza fecale.

Come si svolge la colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare?

La colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare è un esame indolore, eseguito con una preventiva introduzione di mezzo di contrasto iodato non ionico in vescica, di bario in intestino tenue (assunzione per bocca) e di bario in cavità vaginale e rettale, al fine di renderli visibili all'esame radiologico.

Il paziente viene fatto sedere su una sedia di materiale radiotrasparente che consente l'osservazione radioscopica. Nel corso dell'esame viene analizzata la dinamica evacuativa, e le sue alterazioni, e la morfologia degli organi in esami al fine di osservarne eventuali alterazioni per permettere successivamente adeguate valutazioni terapeutiche al chirurgo proctologo.

Durata della colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare:

La colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare dura mediamente 15/20 minuti.

Controindicazioni della colpo-cisto-defecografia con opacizzazione ileare:

Rappresentano controindicazioni all'effettuazione della colpo-cisto-defecografia eventuali conosciute allergie al mezzo di contrasto, il bario o lo iodio (che devono essere riferite al medico esecutore).

La metodica può essere eseguita anche in corso del ciclo mestruale.

La gravidanza è senza alcun dubbio una controindicazione assoluta all'esecuzione dell'esame ed il solo sospetto deve essere comunicato agli operatori sanitari.